

Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Avertissement destiné aux Agriculteurs du Lauragais, de la Piège et du Razès
rédigé en collaboration avec les GDA, les Coopératives et la ferme de Loudes

N° 9 C du 04/05/92

GRANDES CULTURES N° 2

BLE : sauf cas particuliers ... RAS

ORGE : traitement EPIAISON

POIS : traitement FLORAISON

COLZA : RAS

BLE

* * * * *
* **ROUILLE BRUNE** *
* * * * *

Nous n'avons pas encore observé de Rouille Brune et confirmons
notre pronostic du 19/03

* * * * *
* **SEPTORIOSES** *
* * * * *

On peut noter la présence de Septoriose (nodorum) sur quelques
parcelles; pour le moment pas de risques, nous surveillons son
évolution et vous alerterons le cas échéant le moment venu.

* * * * *
* **OIDIUM** *
* * * * *

Présent dans un petit nombre de parcelles; sa seule présence ne
justifie pas à notre point de vue d'intervention spécifique pour
le moment.

Toutefois, en cas de doute ou de nécessité, n'hésitez pas à consulter votre technicien
de secteur ou de coopérative, ou le SPV.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67 92 41 42





Ces cultures vont être à la pleine épiaison dans les jours qui viennent, on peut noter la présence de **RHYNCHOSPORIOSE** et d'**OIDIUM**.

"A noter que ce dernier est moins gênant au stade actuel de ces cultures que sur des plantes jeunes"

Il convient de procéder à un traitement de couverture dès réception du présent avis à l'aide d'une des solutions suivantes :

STARK CE	0.8	L/HA
PUNCH CS	0.8	L
MAGIC	1.5	L



Les pois protéagineux sont au début floraison; l'**ANTHRACNOSE** est observable mais à des niveaux relativement faibles, cependant il convient de la contrôler.

Les tous premiers **PUCERONS** ont été vus, et c'est le début de la période d'activité de la **BRUCHE** du pois qui se manifeste en cette saison dès que les températures sont suffisamment élevées.

Traitez dès réception à l'aide d'une des solutions suivantes :

PELTAR	5	L/HA
IMPACT RM	1	L

Rajoutez au fongicide un des insecticides suivants :

SERK	1.5	L
BAYTHROID	0.25	L
TALSTAR	0.2	L
DECIS	0.25	L
KARATE	0.125	L



Surveillez les **PUCERONS**.

Observez soigneusement à partir des bordures et si vous notez la présence d'au moins 2 colonies/m² intervenez à l'aide d'une des spécialités suivantes :

MAVRIK	0.2	L
KARATE	0.15	L
SERK EC	1.5	L
PIRIMOR G	0.5	KG

